

**MP2065 - Pľúca - mnohopočetné ložiská
sekundárneho karcinómu v pľúcach a
pohrudnici**

Objednávací kód: **4003.MP2065**



Cena bez DPH 970,00 Eur

Cena s DPH 1.173,70 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Klinická história

Táto 47ročná žena bola prijatá s terminálnou karcinomatózou. Pri vyšetrení bola hmatateľná tvrdá pečeň a hmota v pravej časti panvy. Už mesiace bola chorá s konštitučnými príznakmi a nakoniec vyhľadala lekársku pomoc. Bola prijatá do paliatívnej starostlivosti a krátko na to zomrela.

Patológia

Ľavé intaktné pľúca majú mnoho bledých nádorových uzlín rôznej veľkosti, ktoré sú rozptýlené po celom obsahu pľúc. V blízkosti hilu sa

zbieha niekoľko uzlín. Hilové lymfatické uzliny obsahujú bledé nádorové tkanivo. Pod zhrubenou pohrudnicou na povrchu rebier, mediastina a bránice je možné vidieť malé nádorové uzliny o veľkosti 2 mm až 2 cm. Histologicky sa jednalo o metastatické depozitá adenokarcinómu. Posmrtné bol zistený adenokarcinóm vaječníku s metastázami v pľúcach, srdcu, pečeni a osrdcovníku.

Ďalšie informácie

Pľúcne metastázy sú častejšie než primárny karcinóm pľúc. Zhubné ochorenia vznikajúce kdekoľvek v tele sa môžu rozšíriť do pľúc vďaka ich bohatému prekrveniu a lymfatickej drenáži. Sarkómy obvykle metastázujú krvným riečiskom a karcinómy sa šíria buď krvným riečiskom, lymfatickým systémom, alebo obomi.