

## MP2078 - Nepriechodnosť čriev v dôsledku žlčových kameňov

Objednávací kód: 4003.MP2078



Cena bez DPH 362,00 Eur

Cena s DPH 434,40 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

### Klinická história

Päťdesiatštyriročný muž bol hospitalizovaný s 12hodinovými silnými kolikovými bolesťami, nevoľnosťou a vracaním. Mal 3ročnú anamnézu intermitentnej pravej podrebrovej bolesti, kvôli ktorej nenavštívil lekára. Bola mu diagnostikovaná akútna črevná obštrukcia a bola mu prevedená laparotómia.

### Patológia

Tento segment tenkého čreva bol otvorená pre zobrazenie veľkého pigmentovaného vajcovitého žlčového kameňa so zdrsneným povrchom. Táto vzorka je príkladom nepriechodnosti čriev v dôsledku žlčových kameňov.

### Ďalšie informácie

Ochorenie žlčových kameňov je neobvyklou príčinou črevnej obštrukcie – predstavuje len 0,5% prípadov s prevahou u starších a ženských pacientov. Najčastejšie je sekundárne k biliárne-enterickým fistulám (môže byť v proximálnej alebo distálnej časti čreva), ale môže sa tiež

objaviť po sfinkterotómii. Kamene sú obvykle väčšie než 2-2,5 cm a z 70% zasahujú do ilea, zatiaľ čo iné prechádzajú v miestach striktúry/zúženia. Anamnéza môže zahŕňať epizodické obštrukčné príznaky. Diagnóza je potvrdená buď rádiologicky (často na CT vyšetreníu) alebo v dobe odstránenia. Riglerova triáda je typická pre ileus žlčových kameňov a skladá sa z: (1) obštrukcie tenkého čreva, (2) žlčového kameňa mimo žlčníka a (3) vzduchu v žlčových cestách (pneumobilia) pozorovaného pri zobrazovaní a za prítomnosti žlčových kameňov na rovine XR. Liečba je obvykle chirurgická s odstránením obštrukčného kameňa, uzavretím fistuly a cholecystektómiou k zastaveniu opätovného výskytu. Tieto postupy môžu byť nutné rozdeliť na štádia.